

# Las Infecciones Estafilocócicas

## ¿Qué es la infección estafilocócica?

La infección estafilocócica es un tipo de bacteria que frecuentemente causa infecciones de la piel. Las personas con VIH padecen de infecciones de la piel. Esta bacteria vive en la piel y también se esconde en la nariz o en la matriz de la uña. Generalmente no causa infección solamente que la infección entre a través de una lesión o puntura o entre al cuerpo por una vena como cuando alguien usa drogas endovenosas.

## ¿Qué tipo de infecciones puede causar?

Los dos tipos más comunes de infección de estafilocócica son infecciones en la sangre (bacteriemia) y abscesos o celulitis de la piel. También puede causar neumonía, lo cual es más común en alguien que tiene VIH. Si la infección entra en la sangre puede infectar las válvulas del corazón (endocarditis), el cerebro (meningitis) o hueso (osteomielitis).

## ¿Qué es el EDRM?

Estafilococo Dorado Resistente a la Meticilina (EDRM) es un tipo de estafilococo que es resistente al medicamento meticilina, un medicamento que pertenece al grupo de antibióticos llamados penicilina. Generalmente el EDRM solo se encontraba en los hospitales y causaba infecciones en las personas que estuvieron o están en el hospital. Ahora el EDRM frecuentemente se encuentra en personas que lo contagian fuera del hospital y pueden ser tipos más agresivos que son sensitivos a la meticilina.

## ¿Cuál es el tratamiento?

Para la llaga en la piel, muchas veces el único tratamiento necesario se llama incisión y drenaje, que quiere decir que la escapula es usada para abrir la ampolla y dejar que el pus se drene. Esto tiene que ser de una manera estéril en un sitio medico y no en la casa. Ocasionalmente antibióticos pueden ser bucales.

Para los tipos que son sensitivos al meticilina el medicamento que se usa es cefalexin (Keflex) bucal o cefazolin (Ancef) o nafcilin o oxacilin endovenosa. Para EDRM los medicamentos bucales pueden incluir TMP/SMX (Bactrim), clindamicin (Cleocin, rifampin (Rifadin), linezolid (Zyvox), o levofloxacin (levaguin) hay muchos otros medicamentos endovenosos para el tratamiento de esta infección.

El tratamiento para quitar la bacteria de la piel puede ser una pomada llamada Bactroban que debe ser aplicada dentro de la nariz y en la matriz de las uñas dos veces al día para dos semanas. Todas las personas viviendo en un solo hogar deben tener el mismo tratamiento al mismo tiempo porque la bacteria puede pasarse de persona a persona. Sumergirse en un baño de Batadine o Hibiclens una vez por semana también puede disminuir la cantidad de bacteria presente en la piel.

*Si tiene mas preguntas hable con su medico, enfermera o educador de salud.*



**DELTA REGION AIDS EDUCATION AND TRAINING CENTER**

504-903-0788 • [deltaaetc.org](http://deltaaetc.org)